

物理学院 2004-2005 学年第一学期 高等数学 期末试题

请将系别、姓名和学号填写在答题纸上

1. 求下列函数的指定偏导数, 方向导数或微分(共 26 分):

(1)(8 分) 设 $u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{x}\right)$, $f(\cdot, \cdot)$ 有连续偏导, 求全微分;

(2)(8 分) 求函数 $u = \ln(x^2 + 2y + 5z^2)$ 在点 $P(\sqrt{2}, -1, 1)$ 沿方向 $\mathbf{k} = (1, 1, -1)$ 的方向导数;

(3)(10 分) 求由方程

$$f(x + 2y + 3z, x^2 + y^2 + z^2) = 0$$

确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的偏导数和全微分, 其中二元函数 f 有连续偏导.

2. 泰勒展开(共 16 分, 每小题 8 分):

(1) 求函数 $y = \sqrt{1 - 3x + x^2} - \sqrt{1 + 2x - x^3}$ 在 $x = 0$ 的局部泰勒公式至 x^2 阶.

(2) 在点 $(0, 1)$ 的邻域内按泰勒公式展开函数 $z = x^3 - x^2 + xy + x - y$.

3. 平面、直线与向量(共 18 分, 每题 9 分):

(1) 求过点 $(1, 2, -1)$ 和 $(-2, 3, 7)$ 且平行于直线

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$$

的平面.

(2) 设 $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 2, |\mathbf{c}| = 3, |\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}| = \sqrt{17 + 6\sqrt{3}}$ 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}, \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle = \pi/3$, 求 $\langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle = ?$

4. 阶的比较(10 分): 请将以下的十个函数按从左到右重新排好序, 使得在 $x \rightarrow +\infty$ 的极限过程中, 相邻的两个函数都满足: 左边函数是右边函数的高阶无穷小量. (如果一行排不下, 可切换到第二行继续排.)(不必给出证明.)

$$1 - \cos \frac{1}{x}; \quad \arctan x; \quad e^x; \quad (\ln x)^{10}; \quad \csc \frac{1}{x};$$
$$\ln\left(1 + \frac{1}{x^4}\right); \quad (\ln x)^x; \quad e^{-x}; \quad x^{\ln x}; \quad \sqrt{x};$$

注意反面还有 !!

5. 极值问题(10分): 已知函数 $f(x, y, z, w) = x \cdot y \cdot z \cdot w$ 在条件

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{w} = \frac{1}{a}, \quad a > 0, x > 0, y > 0, z > 0, w > 0$$

下存在最小值, 求出这个最小值. 并证明: 当 $a_i > 0 (1 \leq i \leq 4)$ 时, 有

$$\frac{4}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4}} \leq \sqrt[4]{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot a_4}.$$

6. 切线(共 10 分):

(1) (4 分) 设点 $P(x, y, z)$ 在曲线 S

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

上, 其中 F 和 G 有连续偏导. 记过 P 点 S 的切线上的动点坐标是 (X, Y, Z) , 请给出该切线的方程.

(2)(6 分) 证明下列曲线

$$\begin{cases} H\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0, \\ K\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0 \end{cases}$$

的所有切线都通过同一个定点, 其中 a, b, c 为常数, 二元函数 H 和 K 有连续偏导.

7. 证明题(10分): 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $()$ 内二阶可导, 过点 $(0, f(0))$ 与 $(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $(c, f(c)), 0 < c < 1$ 证明: 存在点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

祝开心每一题!