

集合论与图论

第八讲 图

孙猛

北京大学数学科学学院信息科学系

<http://www.is.pku.edu.cn/~sunm>
sunmeng@math.pku.edu.cn

2013.4.23

图

- 图的基本概念
- 通路与回路

无向图的定义

定义

设 A 、 B 为任意两个集合，称 $\{\{a, b\} \mid a \in A \wedge b \in B\}$ 为 A 与 B 的无序积，记作 $A \& B$ 。

- 无序积中的无序对 $\{a, b\}$ 记为 (a, b) ，并且允许 $a = b$ 。
- 注意：**无论 a 与 b 是否相等，均有 $(a, b) = (b, a)$ 。

定义

一个无向图是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$ ，记作 G ，其中

- $V \neq \emptyset$ 称为 G 的顶点集，其元素称为顶点或结点；
- E 称为边集，它是无序积 $V \& V$ 的多重子集，其元素称为无向边，简称为边。

有向图的定义和图的图形表示

定义

一个**有向图**是一个有序的二元组 $\langle V, E \rangle$, 记作 D , 其中

- ① $V \neq \emptyset$ 称为 D 的**顶点集**, 其元素称为**顶点或结点**;
- ② E 称为**边集**, 它是笛卡尔积 $V \times V$ 的多重子集, 其元素称为**有向边**, 简称为**边**。

对于无向图 G 和有向图 D , 可用圆圈表示顶点, 顶点之间的线段表示无向边, 用有向线段表示有向边, 给出无向图或有向图的图形表示。

例

画出下面二图的图形:

- ① $G = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $E = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_1), (v_2, v_3), (v_3, v_1), (v_3, v_4)\}$;
- ② $D = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E = \{\langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_1, v_3 \rangle, \langle v_3, v_1 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle, \langle v_4, v_4 \rangle\}$ 。

图的基本概念

- 在图的定义中，用 G 和 D 分别表示无向图和有向图，有时也用 G 泛指一个图（无向图或有向图），但是 D 只能表示有向图。
- 为方便起见，有时用 $V(G), E(G)$ 分别表示图 G 的顶点集和边集，用 $V(D), E(D)$ 表示有向图 D 的顶点集和边集，另外，用 $|V(G)|, |E(G)|$ 和 $|V(D)|, |E(D)|$ 分别表示 G 和 D 的顶点数和边数。
- 若 $|V(G)| = n$ (或 $|V(D)| = n$)，则称 G (或 D) 为 **n 阶图** (或 **n 阶有向图**)。
- 对图 G 来说，若 $|V(G)|$ 和 $|E(G)|$ 均为有限数，则称 G 为 **有限图**。
- 无向图用 $e_k = (v_i, v_j)$ 表示边，有向图用 $e_k = \langle v_i, v_j \rangle$ 表示有向边。有向图 D 中各向边的箭头都去掉得到的无向图 G 称为 D 的 **基图**。
- 在图 G 中，若 $E(G) = \emptyset$ ，则称 G 为 **零图**，此时若 $|V(G)| = n$ ，则称 G 为 **n 阶零图**，记为 N_n ，称 N_1 为 **平凡图**。
- 图的运算可能产生顶点集为空集的结果，规定顶点集为 \emptyset 的图为 **空图**，记为 \emptyset 。
- 图的图形表示中顶点和边都不标定字母的图称为 **非标定图**，顶点或边用字母标定的图称为 **标定图**。

图的基本概念

定义

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个无向图， $e_k = (v_i, v_j) \in E$ ，则称 v_i, v_j 为 e_k 的端点， e_k 与 v_i (e_k 与 v_j) 是彼此相关联的。若 $v_i \neq v_j$ ，则称 e_k 与 v_i (e_k 与 v_j) 的关联次数为 1，若 $v_i = v_j$ ，则称 e_k 与 v_i 的关联次数为 2，此时称 e_k 为环。设 $v_l \in V$ ， $v_l \neq v_i$ ， $v_l \neq v_j$ ，则称 e_k 与 v_l 的关联次数为 0。

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一个有向图， $e_k = \langle v_i, v_j \rangle \in E$ ，称 v_i, v_j 为 e_k 的端点，并称 v_i 为 e_k 的始点， v_j 为 e_k 的终点，若 $v_i = v_j$ ，称 e_k 为 D 中的一个环。

无论在无向图还是有向图中，无边关联的顶点均称为孤立点。

定义

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个无向图，对任意的 $v_i, v_j \in V$ ，若存在边 $e_k \in E$ ，使得 $e_k = (v_i, v_j)$ ，则称 v_i 与 v_j 是彼此相邻的，简称相邻的。

对于任意的 $e_k, e_l \in E$ ，若 e_k 与 e_l 至少有一个公共端点，则称 e_k 与 e_l 是彼此相邻的，简称相邻的。

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一个有向图，对任意的 $v_i, v_j \in V$ ，若存在边 $e_k \in E$ ，使得 $e_k = \langle v_i, v_j \rangle$ ，则称 v_i 邻接到 v_j ， v_j 邻接于 v_i 。

图的基本概念







定义

- 设 G 为任意一个无向图, 对任意的 $v \in V(G)$,
 - 称 $\{u \mid u \in V(G) \wedge (u, v) \in E(G) \wedge u \neq v\}$ 为 v 的邻域, 记作 $N_G(v)$ 。
 - 称 $N_G(v) \cup \{v\}$ 为 v 的闭邻域, 记作 $\overline{N}_G(v)$ 。
 - 称 $\{e \mid e$ 与 v 相关联 $\}$ 为 v 的关联集, 记作 $I_G(v)$ 。
- 设 D 为任意一个有向图, 对任意的 $v \in V(D)$,
 - 称 $\{u \mid u \in V(D) \wedge \langle v, u \rangle \in E(D) \wedge u \neq v\}$ 为 v 的后继元集, 记作 $\Gamma_D^+(v)$ 。
 - 称 $\{u \mid u \in V(D) \wedge \langle u, v \rangle \in E(D) \wedge u \neq v\}$ 为 v 的先驱元集, 记作 $\Gamma_D^-(v)$ 。
 - 称 $\Gamma_D^+(v) \cup \Gamma_D^-(v)$ 为 v 的邻域, 记作 $N_D(v)$ 。
 - 称 $N_D(v) \cup \{v\}$ 为 v 的闭邻域, 记作 $\overline{N}_D(v)$ 。

多重图与简单图

定义

- 设 G 为一无向图, $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_r} \in E(G)$, $r \geq 2$, 若 $e_{i_s} = (v_i, v_j)$, $1 \leq s \leq r$, 称 $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_r}$ 为平行边, r 为边 (v_i, v_j) 的重数。
- 设 D 为一有向图, $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_r} \in E(D)$, $r \geq 2$, 若 $e_{i_s} = \langle v_i, v_j \rangle$, $1 \leq s \leq r$, 称 $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_r}$ 为平行边, r 为有向边 $\langle v_i, v_j \rangle$ 的重数。
- 称含平行边的图为多重图, 不含平行边也不含环的图为简单图。



结点的度数

定义

- 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 对于任意的 $v \in V$, 称 v 作为 G 中边的端点的次数之和为 v 的 **度数**, 简称 **度**, 记作 $d_G(v)$, 在不混淆的情况下可简记为 $d(v)$ 。
- 设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 对于任意的 $v \in V$, 称 v 作为 D 中边的始点的次数之和为 v 的 **出度**, 记作 $d_D^+(v)$, 简记为 $d^+(v)$ 。称 v 作为 D 中边的终点的次数之和为 v 的 **入度**, 记作 $d_D^-(v)$, 简记为 $d^-(v)$ 。
称 $d_D^+(v) + d_D^-(v)$ 为 v 的 **度数**, 记作 $d_D(v)$, 简记为 $d(v)$ 。

最大(最小)度数

- 设 G 为无向图, 令

$$\Delta(G) = \max\{d(v) \mid v \in V(G)\}$$

$$\delta(G) = \min\{d(v) \mid v \in V(G)\}$$

则 $\Delta(G), \delta(G)$ 分别为 G 的**最大度数**和**最小度数**, 简称**最大度**和**最小度**。

- 设 D 为一个有向图, 类似可定义 D 中的最大度数 $\Delta(D)$ 和最小度数 $\delta(D)$ 。另外, 令

$$\Delta^+(D) = \max\{d^+(v) \mid v \in V(D)\}$$

$$\delta^+(D) = \min\{d^+(v) \mid v \in V(D)\}$$

$$\Delta^-(D) = \max\{d^-(v) \mid v \in V(D)\}$$

$$\delta^-(D) = \min\{d^-(v) \mid v \in V(D)\}$$

它们依次称为 D 的**最大出度**, **最小出度**, **最大入度**, **最小入度**。

- 若 G 为 n 阶无向简单图, 则 $\Delta(G) \leq n - 1$, 若 D 为 n 阶有向简单图, 则 $\Delta(D) \leq 2(n - 1)$ 。

图论的基本定理（握手定理）

定理

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个无向图， $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $|E| = m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m.$$

定理

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一个有向图， $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $|E| = m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m \text{ 且 } \sum_{i=1}^n d^+(v_i) = \sum_{i=1}^n d^-(v_i) = m.$$

推论

任何图 G (无向图或有向图) 中, 奇度数顶点的个数是偶数。

- 度数为奇数的顶点称为**奇度顶点**, 度数为偶数的顶点称为**偶度顶点**。

度数列

定义

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一无向图， $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，称 $(d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n))$ 为 G 的 **度数列**。

- 对于顶点编好号的给定图 G ，它的度数列是惟一确定的。
- 对于任意给定的非负整数列， $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ ，若存在以 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集的 n 阶图 G ，以 \mathbf{d} 为度数列，则称 \mathbf{d} 是 **可图化的**。特别地，若存在以 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集的 n 阶简单图 G ，以 \mathbf{d} 为度数列，则称 \mathbf{d} 是 **可简单图化的**。

$\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ ($d_i \geq 0$ 且为整数， $i = 1, 2, \dots, n$) 在什么条件下是可图化的？在什么条件下是可简单图化的？

整数列可图化的充要条件

定理


$\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ ($d_i \geq 0$ 且为整数, $i = 1, 2, \dots, n$) 是可图化的当且仅当 $\sum_{i=1}^n d_i = 0 \pmod{2}$ 。

整数列可图化的充要条件

例

下面给出的两个整数列，哪个是可图化的？

- (1) $\mathbf{d} = (5, 4, 4, 3, 3, 2)$; (2) $\mathbf{d} = (5, 3, 3, 2, 1)$ 。



整数列可简单图化的充要条件

定理

设非负整数列 $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ ($d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n \geq 0$)

则 \mathbf{d} 是可简单图化的当且仅当对于每个整数 r , $1 \leq r \leq (n-1)$, $\sum_{i=1}^r d_i \leq r(r-1) + \sum_{i=r+1}^n \min\{r, d_i\}$, 且 $\sum_{i=1}^n d_i \equiv 0 \pmod{2}$ 。

例

判断下列各非负整数列是否是可简单图化的?

- (1) $\mathbf{d} = (5, 4, 3, 2, 2, 1)$; (2) $\mathbf{d} = (5, 4, 4, 3, 2)$;
- (3) $\mathbf{d} = (3, 3, 3, 1)$; (4) $\mathbf{d} = (6, 6, 5, 4, 3, 3, 1)$;
- (5) $\mathbf{d} = (5, 5, 3, 3, 2, 2, 2)$; (6) $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$, $d_1 > d_2 > \dots > d_n \geq 1$.

整数列可简单图化的充要条件

定理

设非负整数列 $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$, $\sum_{i=1}^n d_i = 0 \pmod{2}$, 且 $(n-1) \geq d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n \geq 0$, 则 \mathbf{d} 是可简单图化的当且仅当 $\mathbf{d}' = (d_2 - 1, d_3 - 1, \dots, d_{d_1+1} - 1, d_{d_1+2}, \dots, d_n)$ 是可简单图化的。

例

判断下列两个非负整数列是否是可简单图化的?

- (1) $\mathbf{d} = (5, 5, 4, 4, 2, 2)$; (2) $\mathbf{d} = (4, 4, 3, 3, 2, 2)$ 。

图的同构


定义

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个无向图, 若存在双射函数 $f : V_1 \rightarrow V_2$, 对于任意的 $v_i, v_j \in V_1$ ($f(v_i), f(v_j) \in V_2$), $(v_i, v_j) \in E_1$ 当且仅当 $(f(v_i), f(v_j)) \in E_2$ 且 (v_i, v_j) 与 $(f(v_i), f(v_j))$ 重数相同, 则称 G_1 与 G_2 同构, 记为 $G_1 \cong G_2$ 。

定义

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个有向图, 若存在双射函数 $f : V_1 \rightarrow V_2$, 对于任意的 $v_i, v_j \in V_1$ ($f(v_i), f(v_j) \in V_2$), $\langle v_i, v_j \rangle \in E_1$ 当且仅当 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle \in E_2$ 且 $\langle v_i, v_j \rangle$ 与 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle$ 重数相同, 则称 G_1 与 G_2 同构, 记为 $G_1 \cong G_2$ 。

图的同构




(a)




(b)




(c)




(d)




(e)




(f)



(g)



(h)




(i)

完全图和竞赛图

定义


- 设 G 为 n ($n \geq 1$) 阶无向简单图, 若 G 中每个顶点均与其余的 $n - 1$ 个顶点相邻, 则称 G 为**阶无向完全图**, 记作 K_n 。
- 设 D 为 n ($n \geq 1$) 阶有向简单图, 若对于任意的 $v_i, v_j \in V(D)$ ($v_i \neq v_j$), 均有 $\langle v_i, v_j \rangle \in E(D) \wedge \langle v_j, v_i \rangle \in E(D)$, 则称 D 为**阶有向完全图**。
- 设 D 为 n ($n \geq 1$) 阶有向简单图, 若对于任意的 $v_i, v_j \in V(D)$ ($v_i \neq v_j$), 有向边 $\langle v_i, v_j \rangle$ 和 $\langle v_j, v_i \rangle$ 中有且仅有一个属于 $E(D)$, 则称 D 为**阶竞赛图**。



正则图

定义

设 G 为 n ($n \geq 1$) 阶无向简单图, 若对于任意的 $v \in V(G)$, 均有 $d(v) = k$, 则称 G 为 k -正则图。




- n 阶零图 N_n 是 0-正则图;
- 无向完全图 K_n 是 $(n - 1)$ -正则图;
- Petersen 图是 3-正则图;
- 上面的图是 Plato 图, 其中 (a), (b), (d) 为 3-正则图, (c) 为 4-正则图, (e) 为 5-正则图。

r部图


定义

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一个 n 阶无向图，若 V 能分成 $r (r \geq 2)$ 个互不相交的子集 V_1, V_2, \dots, V_r ，使得 G 中任何一条边的两个端点都不在同一个 V_i ($i = 1, 2, \dots, r$) 中，则称 G 为 **r部图**，记为 $G = \langle V_1, V_2, \dots, V_r, E \rangle$ 。特别地，当 $r = 2$ 时，称 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为 **二部图**（或称 **偶图**）。


设 G 是简单 r 部图，若对任意的 i ($i = 1, 2, \dots, r$)， V_i 中任一个顶点均与 $V_j (j \neq i)$ 中所有顶点相邻，则称 G 为 **完全r部图**，当 $|V_i| = n_i$ 时，记 $G = K_{n_1, n_2, \dots, n_r}$ ，当 $r = 2$ 时，完全二部图 $G = K_{n_1, n_2}$ 。




(a)




(b)




(c)



(d)



(e)



(f)

r部图

在 n 阶完全 r 部图 K_{n_1, n_2, \dots, n_r} 中， $n = \sum_{i=1}^r n_i$, $m = \sum_{i < j} n_i n_j$ 。当 n, r 固定后， n_1, n_2, \dots, n_r 各取何值时，使得该 n 阶完全 r 部图中，边数 m 达到最大？

对于固定的正整数 $n, r (n > r)$ ，存在 $k, s (k \geq 1, 0 \leq s < r)$ ，使得 $n = kr + s$ ，即 $n_1 = n_2 = \dots = n_s = k + 1, n_{s+1} = n_{s+2} = \dots = n_r = k$ ，此时 K_{n_1, n_2, \dots, n_r} 的边数最多，即 m 取最大值。

记边数 m 达到最大值的 n 阶完全 r 部图 K_{n_1, n_2, \dots, n_r} 为 $T_r(n)$ ，它的边数 m 记为 $t_r(n)$ 。

设 $G = \langle V_1, V_2, \dots, V_r, E \rangle$ 为任意的 n 阶 r 部图，设 $n_i = |V_i|$ ，则 G 的边数 m 满足 $m \leq \sum_{i < j} n_i n_j \leq t_r(n)$ ，当 $m = t_r(n)$ 时，必有 $G \cong T_r(n)$ 。

子图

定义

设 $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$ 为两个图 (同为无向图或同为有向图), 若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$, 则称 G' 是 G 的子图, G 为 G' 的母图, 记作 $G' \subseteq G$ 。


已知 $G' \subseteq G$, 又

- 若 $V' \subset V$ 或 $E' \subset E$, 则称 G' 是 G 的真子图;
- 若 $V' = V$, 则称 G' 为 G 的生成子图;


设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一图, $V_1 \subset V$, 且 $V_1 \neq \emptyset$, 称以 V_1 为顶点集, 以 G 中两个端点都在 V_1 中的边组成边集 E_1 的图, 为 G 的 V_1 导出的子图, 记作 $G[V_1]$ 。

又设 $E_1 \subset E$ 且 $E_1 \neq \emptyset$, 称以 E_1 为边集, 以 E_1 中的边关联的顶点为顶点集 V_1 的图, 为 G 的 E_1 导出的子图, 记作 $G[E_1]$ 。


子图



(a)



(b)



(c)

补图

定义

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为 n 阶简单图（无向或有向），称以 V 为顶点集，以使 G 成为 n 阶完全图的所有添加边组成的集合为边集的图为 G 的补图，记作 \overline{G} 。若 $G \cong \overline{G}$ ，则称 G 为自补图。

自补图 G 的阶 n 应满足什么条件？

图的运算

定义

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一无向图，

- ① 设 $e \in E$, 用 $G - e$ 表示从 G 中去掉边 e , 称为 **删除 e** 。设 $E' \subset E$, 用 $G - E'$ 表示从 G 中删除 E' 中的所有边, 称为 **删除 E'** 。
- ② 设 $v \in V$, 用 $G - v$ 表示从 G 中去掉 v 以及 v 关联的一切边, 称为 **删除顶点 v** 。又设 $V' \subset V$, 用 $G - V'$ 表示从 G 中删除 V' 中的所有顶点, 称为 **删除 V'** 。
- ③ 设 $e = (u, v) \in E$, 用 $G \setminus e$ 表示从 G 中删除 e , 将 e 的两个端点 u, v 用一个新的顶点 w 代替 (w 也可取成 u 或 v) , 使 w 关联除 e 外的 u, v 关联的一切边, 称为 **边 e 的收缩**。
- ④ 设 $u, v \in V$ (u, v 可能相邻也可能不相邻), 用 $G \cup (u, v)$ (或 $G + (u, v)$) 表示在 u, v 之间加一条边 (u, v) , 称为 **加新边**。

注意：简单图经过边的收缩或加新边后，可变成非简单图。

图的运算

定义

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个图。

- ① 若 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 则称 G_1 与 G_2 是不交的;
- ② 若 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 则称 G_1 与 G_2 是边不交的, 或边不重的。

图的运算

定义

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 均为无孤立点的图。

- ① 称以 $E_1 \cup E_2$ 为边集, 以 $E_1 \cup E_2$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **并图**, 记作 $G_1 \cup G_2$ 。
 - ② 称以 $E_1 \cap E_2$ 为边集, 以 $E_1 \cap E_2$ 中边关联的一切顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **交图**, 记作 $G_1 \cap G_2$ 。
 - ③ 称以 $E_1 - E_2$ 为边集, 以 $E_1 - E_2$ 中边关联的一切顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **差图**, 记作 $G_1 - G_2$ 。
 - ④ 称以 $E_1 \oplus E_2$ (\oplus 为对称差运算) 为边集, 以 $E_1 \cup E_2$ 中边关联的一切顶点组成的集合为顶点集的图为 G_1 与 G_2 的 **环和**, 记作 $G_1 \oplus G_2$ 。
- 当 $G_1 = G_2$ 时, $G_1 \cup G_2 = G_1 \cap G_2 = G_1(G_2)$, $G_1 - G_2 = G_2 - G_1 = G_1 \oplus G_2 = \emptyset$ (空图);
 - 当 G_1 与 G_2 边不重时, $G_1 \cap G_2 = \emptyset$, $G_1 - G_2 = G_1$, $G_2 - G_1 = G_2$, $G_1 \oplus G_2 = G_1 \cup G_2$ 。

图的运算

定义

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个不交无向图。称以 $V = V_1 \cup V_2$ 为顶点集, 以 $E = E_1 \cup E_2 \cup \{(u, v) | u \in V_1 \wedge v \in V_2\}$ 为边集的图 G 为 G_1 与 G_2 的 **联图**, 记作 $G = G_1 + G_2$ 。

由定义可知 $K_r + K_s = K_{r+s}$ 且 $N_r + N_s = K_{r,s}$ 。

若 $|V_1| = n_1$, $|E_1| = m_1$, $|V_2| = n_2$, $|E_2| = m_2$, 则联图中顶点数 $n = n_1 + n_2$, 边数 $m = m_1 + m_2 + n_1 n_2$ 。

图的运算

定义

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个无向简单图。称以 $V = V_1 \times V_2$ 为顶点集, 以 $E = \{(\langle u_i, u_j \rangle, \langle v_k, v_s \rangle) | (\langle u_i, u_j \rangle, \langle v_k, v_s \rangle \in V_1 \times V_2 \wedge (u_i = v_k \wedge u_j \text{ 与 } v_s \text{ 相邻} \vee u_j = v_s \wedge u_i \text{ 与 } v_k \text{ 相邻}))\}$ 为边集的图 G 为 G_1 与 G_2 的积图, 记作 $G = G_1 \times G_2$ 。

若 $|V_1| = n_1$, $|E_1| = m_1$, $|V_2| = n_2$, $|E_2| = m_2$, 则积图中顶点数 $n = n_1 n_2$, 边数 $m = n_1 m_2 + n_2 m_1$ 。

图的运算

用0,1分别表示 K_2 的两个端点, 令

$$Q_1 = K_2,$$

$$Q_2 = K_2 \times Q_1,$$

...

$$Q_k = K_2 \times Q_{k-1}, k \geq 3$$

则称 Q_k 为**k-方体图**。

图

- 图的基本概念
- 通路与回路

无向图中的通路与回路

定义

设 G 为无向标定图， G 中顶点与边的交替序列 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} e_{j_2} \cdots e_{j_l} v_{i_l}$ 称为顶点 v_{i_0} 到顶点 v_{i_l} 的通路，其中 $v_{i_{r-1}}, v_{i_r}$ 为 e_{j_r} 的端点， $r = 1, 2, \dots, l$ ， v_{i_0}, v_{i_l} 分别称为 Γ 的始点和终点， Γ 中边数 l 称为 Γ 的长度。若 $v_{i_0} = v_{i_l}$ ，则称通路 Γ 为回路。

若 Γ 的所有边各异，则称 Γ 为简单通路，此时若 $v_{i_0} = v_{i_l}$ ，则称 Γ 为简单回路。

若 Γ 的所有顶点（除 v_{i_0} 与 v_{i_l} 可能相同外）各异，所有边也各异，则称 Γ 为初级通路，或称 Γ 为一条路径，此时若 $v_{i_0} = v_{i_l}$ ，则称 Γ 为初级回路或圈，并将长度为奇数的圈称为奇圈，长度为偶数的圈称为偶圈。

若 Γ 中有边重复出现，则称 Γ 为复杂通路，又此时若 $v_{i_0} = v_{i_l}$ ，则称 Γ 为复杂回路。

有向图中通路、回路及其分类的定义与无向图类似，只是注意有向图中通路与回路中有向边方向的一致性，即在 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} e_{j_2} \cdots e_{j_l} v_{i_l}$ 中， $v_{i_{r-1}}$ 必为 e_{j_r} 的始点，而 v_{i_r} 必为 e_{j_r} 的终点， $r = 1, 2, \dots, l$ ，并且初级回路也简称为圈。

通路与回路的表示法

定义中通路（回路）表示为顶点与边的交替序列，除此之外还有如下的简便方法表示通路与回路：

- ① 用边的序列表示通路（回路）。上一定义中的 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} e_{j_2} \cdots e_{j_l} v_{i_l}$ 可以表示为 $e_{j_1} e_{j_2} \cdots e_{j_l}$ 。
- ② 在简单图中用顶点的序列表示通路（回路）。前面的 Γ 在简单图中可表示为 $v_{i_0} v_{i_1} \cdots v_{i_l}$ 。
- ③ 为了写出非标定图中的通路（回路），将非标定图先标成标定图，或只标定所求通路（回路），然后再写出通路（回路）。
- ④ 将图中的通路（回路）在图外重新画出。

图的周长与围长

定义

在含圈的无向简单图 G 中，称 G 中最长圈的长度为 G 的周长，记作 $c(G)$ ，称 G 中最短圈的长度为 G 的围长，记作 $g(G)$ 。

例

- 无向完全图 $K_n (n \geq 3)$ 的周长为 n ，围长为 3。
- 完全二部图 $K_{n,n} (n \geq 2)$ 的周长为 $2n$ ，围长为 4。

通路与回路的性质

定理

在 n 阶图 G 中，若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路，则从 v_i 到 v_j 存在长度小于等于 $n - 1$ 的通路。

推论

在 n 阶图 G 中，若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路，则从 v_i 到 v_j 存在长度小于等于 $n - 1$ 的路径。

定理

在 n 阶图 G 中，若存在从顶点 v_i 到自身的回路，则存在从 v_i 到自身长度小于等于 n 的回路。

推论

在 n 阶图 G 中，若存在从顶点 v_i 到自身的简单回路，则一定存在 v_i 到自身的长度小于等于 n 的初级回路（圈）。

扩大路径法

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向图， $E \neq \emptyset$ ，设 $\Gamma_I = v_0v_1 \cdots v_I$ 为 G 中的一条路径，若始点 v_0 与 Γ_I 外的某顶点相邻，就将该顶点及关联的边扩到 Γ_I 中来，若新路径的始点还与新的路径外的顶点相邻，就再将它及其相关联的边扩到新的路径中来，得到更新的路径，继续这一过程，直到最后所得路径的始点不与其它所有路径外的任何顶点相邻为止，设终止时的路径为 $\Gamma_{I+k} = v_0v_1 \cdots v_{I+k}$ ， $k \geq 0$ 。再对 Γ_{I+k} 的终点 v_{I+k} 继续上述过程，设最终得到的路径为 $\Gamma_{I+k+r} = v_0v_1 \cdots v_{I+k+r}$ ， $k, r \geq 0$ ，它的始点 v_0 与终点 v_{I+k+r} 不与 Γ_{I+k+r} 外的任何顶点相邻。则称 Γ_{I+k+r} 为“**极大路径**”，并称用构造极大路径证明定理或命题的方法为“**扩大路径法**”。

类似地，可以在有向图 D 中构造“极大路径”，只需注意，当从路径的始点 v_0 扩大时，需要找 Γ 外的邻接到 v_0 的顶点，而从路径的终点 v_I 扩大时，需要找 Γ 外的邻接于 v_I 的顶点。

扩大路径法

例

设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶无向简单图, $\delta(G) \geq 2$, 证明 G 中存在长度大于等于3的圈。

扩大路径法

例

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向简单图, $\delta(D) \geq 2$, 且 $\delta^-(D) > 0$, $\delta^+(D) > 0$,
证明 D 中存在长度大于等于 $\max\{\delta^-(D), \delta^+(D)\} + 1$ 的圈。